

KENAVO RATS SOURIS MULOTS

GRAINS

Informations réglementaires

Type de produit : TP14 – Rodenticide

Type de formulation : Appât prêt à l'emploi sous forme de grains

Substance active : Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)

Concentration : 0,0025% m/m

Amérisant : contient un amérisant

Nom homologué : AVOINE DÉCORTIQUÉE

N° d'AMM : FR-2015-0015 / produit destiné à une utilisation par le grand public et les non professionnels.

Organismes ciblés : Rats noirs (*Rattus rattus*), rats bruns (*Rattus norvegicus*), souris (*Mus musculus*) et mulots (*Apodemus sylvaticus*).

Application : intérieur contre les souris, mulots et les rats et extérieurs, autour des bâtiments, contre les rats uniquement.

Mode d'action

Le Bromadiolone est un anticoagulant de deuxième génération. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes. Les premiers symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion et la mort survient en moyenne 4 à 10 jours plus tard.

Mode et doses d'emploi

Le port des gants est recommandé. Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés. Le nombre de points d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.

Contre les rats : 50 à 100g d'appât par poste d'appâtage espacés de 5 à 10 m.

Contre les mulots : 50g d'appât par poste d'appâtage espacés de 2 à 5 m.

Contre les souris : 25g d'appât par poste d'appâtage espacés de 2 à 5 m.

Les boîtes d'appâtage sécurisées doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours (lutte contre les souris) et tous les 5 à 7 jours (lutte contre les mulots et les rats) au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Utilisation autour des bâtiments, aux abords des infrastructures (contre les rats uniquement) : placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Ne pas ouvrir les sachets. Retirer toutes les boîtes d'appâts après la fin du traitement. Se laver les mains après utilisation.

ATTENTION
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



Référence et conditionnement

Réf. KR0004 : Étui de 150 g (6x25 g)

Précautions d'utilisation

TP14 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche.

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

NE PAS UTILISER DE RODENTICIDES ANTICOAGULANTS EN GUISE D'APPÂTS PERMANENTS

L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (si l'activité des rongeurs continue d'être observée), demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « Ne pas déplacer ni ouvrir », « Contient un rodenticide », « AVOINE DÉCORTIQUÉE », « Bromadiolone », « En cas d'incident, contacter un centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 »

Stockage et élimination

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié. Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.